

Parámetros biológicos del parasitoide *Encarsia formosa* (Gahan) (Hymenoptera: Aphelinidae) en condiciones de laboratorio

López, S. & E. Botto

[\[Descargar el artículo\]](#) (207 KB)

Variación estacional de *Drosophila* spp. en Mar del Plata, Argentina

Fernández Iriarte, P. & M. López

[\[Descargar el artículo\]](#) (204 KB)

División de recursos entre hormigas epigeicas e hipogeicas (Hymenoptera: Formicidae) en una plantación de cacao en Brasil [En inglés]

Harold F. Fowler & Jacques H.C. Delabie

[\[Descargar el artículo\]](#) (514 KB)

Efecto de la remoción de especies y la introducción de maíz sobre la estructura de la comunidad de malezas en la región semiárida de Córdoba, Argentina

Barchuk, A. , E. Alessandria, J. Zamar, S. Luque & F. Casanoves

[\[Descargar el artículo\]](#) (341 KB)

Composición y distribución de Macrozoobentos de un sistema lótico andino-patagónico

Miserendino, M. L.

[\[Descargar el artículo\]](#) (661 KB)

Efectos de la remoción de la biomasa aérea de las especies más abundantes sobre la estructura de un mallín patagónico

Raffaele, E.

[\[Descargar el artículo\]](#) (448 KB)

Efecto de las condiciones de incubación y pre-incubación sobre el comportamiento germinativo de poblaciones de *Paspalum dilatatum* de la Pampa Deprimida

Blanco, M. A. , G. Schrauf & A. Deregibus

[\[Descargar el artículo\]](#) (395 KB)

Efectos del anegamiento sobre el poder germinativo de las semillas de *Lotus tenuis* y *Lotus corniculatus*. Implicancias para su propagación diferencial en la Depresión del Salado (Buenos Aires, Argentina)

Vignolio, O. R. , N. Maceira & O. Fernández

[\[Descargar el artículo\]](#) (249 KB)