

ANEXO

Anexo 1. Resultados del análisis SIMPER mostrando el aporte relativo de las especies en cada uno de los sitios de muestreo. Se incluyeron sólo las especies que contribuyen al 90% de similitud.

Annex 1. Results of the SIMPER analysis showing the relative contribution of the species at each of the sampling sites. Only the species that contribute to the 90% similarity were included.

Sitio Quequén	
Porcentaje de similitud: 59.78%	
Especies	Contrib. %
<i>Boccardia proboscidea</i>	69.66
<i>Tanais dulonguii</i>	15.17
<i>Brachidontes rodriguezii</i>	4.6
<i>Alitta succinea</i>	3.84
Sitio Costa Bonita	
Porcentaje de similitud: 62.83%	
Especies	Contrib. %
<i>Siphonaria lessonii</i>	20.74
<i>Hyale grandicornis</i>	15.03
<i>Clunio brasiliensis</i>	13.05
<i>Brachidontes rodriguezii</i>	37.52
Sitio Brusquitas	
Porcentaje de similitud: 78.80%	
Especies	Contrib. %
<i>Brachidontes rodriguezii</i>	26.92
<i>Mytilus edulis</i>	19.92
<i>Clunio brasiliensis</i>	13.02
<i>Siphonaria lessonii</i>	12.02
<i>Boccardia proboscidea</i>	8.51
<i>Syllis proluxa</i>	6.19
<i>Leodamas tribulosus</i>	5.6
Sitio Playita	
Porcentaje de similitud: 72.94%	
Especies	Contrib. %
<i>Mytilus edulis</i>	22.28
<i>Brachidontes rodriguezii</i>	18.37
<i>Clunio brasiliensis</i>	15.05
<i>Siphonaria lessonii</i>	9.49
<i>Boccardia proboscidea</i>	9.26
<i>Tanais dulonguii</i>	7.96
<i>Boccardia sp. 1</i>	7.59
Sitio Luna Roja	
Porcentaje de similitud: 63.18%	
Especies	Contrib. %
<i>Brachidontes rodriguezii</i>	23.33
<i>Clunio brasiliensis</i>	14.31
<i>Mytilus edulis</i>	14.14
<i>Tanais dulonguii</i>	10.01
<i>Siphonaria lessonii</i>	8.05
<i>Leodamas tribulosus</i>	6.02
<i>Syllis proluxa</i>	5.93
<i>Syllis spp.</i>	3.74
<i>Lineus bonaerensis</i>	3.66
<i>Nematoda</i>	1.92
Sitio Emisario	
Porcentaje de similitud: 55.27%	
Especies	Contrib. %
<i>Brachidontes rodriguezii</i>	27.15

<i>Leodamas tribulosus</i>	12.57
<i>Alitta succinea</i>	8.56
<i>Syllis spp.</i>	8.21
<i>Nematoda</i>	7.82
<i>Syllis proluxa</i>	7.8
<i>Siphonaria lessonii</i>	7.65
<i>Lineus bonaerensis</i>	7
<i>Boccardia proboscidea</i>	6.44

Sitio Santa Clara del Mar

Porcentaje de similaridad: 70.60%

Especies	Contrib. %
<i>Brachidontes rodriguezii</i>	35.6
<i>Siphonaria lessonii</i>	19.16
<i>Lineus bonaerensis</i>	11.89
<i>Hyale grandicornis</i>	10.08
<i>Syllis spp.</i>	8.43
<i>Leodamas tribulosus</i>	8.2

Sitio Mar de Cobo

Porcentaje de similaridad: 51.34%

Especies	Contrib. %
<i>Brachidontes rodriguezii</i>	64.1
<i>Lineus bonaerensis</i>	10.39
<i>Siphonaria lessonii</i>	8.82
<i>Boccardia proboscidea</i>	5.34
<i>Hyale grandicornis</i>	4.46

Anexo 2. Resultados del análisis SIMPER mostrando el aporte relativo de las especies para cada par de sitios. Se incluyeron sólo las especies que contribuyen al 90% de disimilitud.

Annex 2. Results of the SIMPER analysis showing the relative contribution of species for each pair of sampling sites (cut to 90% dissimilarity).

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Quequén, Costa Bonita Disimilitud media: 74.52	<i>Boccardia proboscidea</i>	7.31	0.68	25.17	25.17
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	1.41	5.04	13.88	39.05
	<i>Siphonaria lessoni</i>	0.00	3.03	11.46	50.51
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.00	2.03	7.64	58.15
	<i>Tanais dulonguii</i>	2.43	1.46	6.35	64.49
	<i>Nematoda</i>	1.59	0.33	5.63	70.13
	<i>Clunio brasiliensis</i>	1.09	2.14	5.37	75.5
	<i>Alitta succinea</i>	1.21	0.92	4.53	80.03
	<i>Balanus glandula</i>	0.00	0.99	3.72	83.75
	<i>Mytilus edulis</i>	0.00	0.99	3.7	87.45
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.00	0.77	2.95	90.41

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Quequén, Las Brusquitas Disimilitud media: 74.74	<i>Boccardia proboscidea</i>	7.31	1.85	19.37	19.37
	<i>Mytilus edulis</i>	0.00	3.99	13.99	33.36
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	1.41	4.95	12.69	46.05
	<i>Siphonaria lessoni</i>	0.00	2.46	8.68	54.73
	<i>Tanais dulonguii</i>	2.43	0.53	7.46	62.19
	<i>Clunio brasiliensis</i>	1.09	2.59	5.79	67.98
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.00	1.57	5.45	73.43
	<i>Nematoda</i>	1.59	0.00	5.26	78.69
	<i>Syllis proluxa</i>	0.00	1.36	4.74	83.43
	<i>Alitta succinea</i>	1.21	0.44	4.28	87.72
		<i>Syllis sp.</i>	0.00	1.09	3.84

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)	
Costa Bonita, Las Brusquitas Disimilitud media: 37.38	<i>Mytilus edulis</i>	0.99	3.99	18.48	18.48	
	<i>Boccardia proboscidea</i>	0.68	1.85	8.57	27.05	
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.44	1.57	7.99	35.04	
	<i>Tanais dulonguii</i>	1.46	0.53	7.89	42.93	
	<i>Hyale grandicornis</i>	2.03	0.81	7.54	50.47	
	<i>Balanus glandula</i>	0.99	0.28	6.74	57.21	
	<i>Syllis proluxa</i>	0.52	1.36	6.33	63.54	
	<i>Syllis sp.</i>	0.33	1.09	5.49	69.03	
	<i>Alitta succinea</i>	0.92	0.44	4.78	73.8	
	<i>Clunio brasiliensis</i>	2.14	2.59	4.52	78.33	
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.77	0.2	4.42	82.75	
	<i>Siphonaria lessoni</i>	3.03	2.46	4.38	87.13	
		<i>Sphaeroma serratum</i>	0.47	0.00	2.92	90.05

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Quequén, Playita Disimilitud media: 68.16	<i>Boccardia proboscidea</i>	7.31	2.47	16.25	16.25
	<i>Mytilus edulis</i>	0.00	4.84	16.12	32.37
	<i>Siphonaria lessoni</i>	0.00	2.87	9.65	42.02
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	1.41	4.02	8.84	50.86
	<i>Clunio brasiliensis</i>	1.09	3.3	7.65	58.5
	<i>Boccardia sp. 1 (claparedei)</i>	0.00	1.93	6.38	64.88
	<i>Nematoda</i>	1.59	0.00	5.02	69.9
		<i>Tanais dulonguii</i>	2.43	2.34	4.47

<i>Alitta succinea</i>	1.21	0.76	4.03	78.41
Larvas de <i>Boccardia</i> sp.	0.00	1.04	3.32	81.73
<i>Syllis</i> sp.	0.00	0.96	3.16	84.88
<i>Idotea baltica</i>	0.5	0.48	2.32	87.2
<i>Monocorophium insidiosum</i>	0.00	0.64	2.21	89.41
<i>Syllis proluxa</i>	0.00	0.56	1.82	91.23

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Costa Bonita, Playita	<i>Mytilus edulis</i>	0.99	4.84	16.48	16.48
Disimilitud media: 47.46	<i>Boccardia</i> sp. 1 (<i>claparedei</i>)	0.00	1.93	8.2	24.68
	<i>Boccardia proboscidea</i>	0.68	2.47	8.16	32.83
	<i>Hyale grandicornis</i>	2.03	0.28	7.41	40.24
	<i>Tanais dulonguii</i>	1.46	2.34	6.32	46.56
	<i>Clumio brasiliensis</i>	2.14	3.3	5.03	51.59
	<i>Balanus glandula</i>	0.99	0.42	4.88	56.47
	<i>Siphonaria lessoni</i>	3.03	2.87	4.8	61.27
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	5.04	4.02	4.41	65.68
	Larvas de <i>Boccardia</i> sp.	0.00	1.04	4.28	69.96
	<i>Syllis</i> sp.	0.33	0.96	3.24	73.2
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.77	0.2	3.07	76.27
	<i>Syllis proluxa</i>	0.52	0.56	3.05	79.32
	<i>Alitta succinea</i>	0.92	0.76	3.00	82.32
	<i>Monocorophium insidiosum</i>	0.00	0.64	2.83	85.15
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.44	0.4	2.44	87.59
	<i>Sphaeroma serratum</i>	0.47	0.00	2.02	89.61
	<i>Idotea baltica</i>	0.00	0.48	1.97	91.58

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Las Brusquitas, Playita	<i>Tanais dulonguii</i>	0.53	2.34	11.82	11.82
Disimilitud media: 32.95	<i>Boccardia</i> sp. 1 (<i>claparedei</i>)	0.46	1.93	8.77	20.59
	<i>Leodamas tribulosus</i>	1.57	0.4	7.85	28.44
	<i>Siphonaria lessoni</i>	2.46	2.87	6.73	35.17
	Larvas de <i>Boccardia</i> sp.	0.00	1.04	5.9	41.07
	<i>Syllis proluxa</i>	1.36	0.56	5.68	46.75
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	4.95	4.02	5.54	52.29
	<i>Boccardia proboscidea</i>	1.85	2.47	5.2	57.48
	<i>Mytilus edulis</i>	3.99	4.84	5.07	62.55
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.81	0.28	4.67	67.23
	<i>Clumio brasiliensis</i>	2.59	3.3	4.24	71.47
	<i>Alitta succinea</i>	0.44	0.76	3.96	75.43
	<i>Monocorophium insidiosum</i>	0.00	0.64	3.89	79.31
	<i>Balanus glandula</i>	0.28	0.42	3.66	82.98
	<i>Syllis</i> sp.	1.09	0.96	3.64	86.61
	<i>Idotea baltica</i>	0.00	0.48	2.72	89.33
	<i>Nereididae</i>	0.00	0.44	2.59	91.92

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Quequén, Luna Roja	<i>Boccardia proboscidea</i>	7.31	0.55	23.4	23.4
Disimilitud media: 79.74	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	1.41	5.18	12.93	36.33
	<i>Tanais dulonguii</i>	2.43	1.52	7.17	43.5
	<i>Mytilus edulis</i>	0.00	2.31	7.15	50.65
	<i>Clumio brasiliensis</i>	1.09	2.48	6.14	56.79
	<i>Siphonaria lessoni</i>	0.00	1.65	5.32	62.12
	<i>Nematoda</i>	1.59	0.2	5.22	67.34
	<i>Syllis</i> sp.	0.00	1.24	4.4	71.75
	<i>Alitta succinea</i>	1.21	0.00	4.3	76.04
	<i>Syllis proluxa</i>	0.00	1.18	3.91	79.95
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.00	1.00	3.56	83.51

<i>Leodamas tribulosus</i>	0.00	0.81	2.45	85.96
<i>Corbula patagonica</i>	0.00	0.77	2.37	88.33
<i>Hyale grandicornis</i>	0.00	0.55	1.61	89.94
<i>Halosydnella australis</i>	0.00	0.5	1.51	91.44

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Costa Bonita, Luna Roja Disimilitud media: 47.99	<i>Tanais dulonguii</i>	1.46	1.52	8.83	8.83
	<i>Siphonaria lessoni</i>	3.03	1.65	8.54	17.38
	<i>Mytilus edulis</i>	0.99	2.31	8.48	25.85
	<i>Hyale grandicornis</i>	2.03	0.55	7.87	33.72
	<i>Clunio brasiliensis</i>	2.14	2.48	6.95	40.67
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	5.04	5.18	5.85	46.52
	<i>Syllis prolixa</i>	0.52	1.18	5.39	51.9
	<i>Balanus glandula</i>	0.99	0.24	5.38	57.28
	<i>Syllis sp.</i>	0.33	1.24	5.26	62.54
	<i>Alitta succinea</i>	0.92	0.00	4.57	67.11
	<i>Boccardia proboscidea</i>	0.68	0.55	4.52	71.63
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.77	1.00	4.31	75.93
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.44	0.81	3.69	79.63
	<i>Corbula patagonica</i>	0.00	0.77	3.49	83.12
	<i>Cyrtograpsus altimanus</i>	0.33	0.28	2.45	85.57
	<i>Sphaeroma serratum</i>	0.47	0.00	2.38	87.95
	<i>Halosydnella australis</i>	0.00	0.5	2.22	90.17

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Las Brusquitas, Luna Roja Disimilitud media: 40.42	<i>Mytilus edulis</i>	3.99	2.31	11.68	11.68
	<i>Tanais dulonguii</i>	0.53	1.52	8.3	19.98
	<i>Siphonaria lessoni</i>	2.46	1.65	8.07	28.05
	<i>Boccardia proboscidea</i>	1.85	0.55	7.23	35.28
	<i>Clunio brasiliensis</i>	2.59	2.48	6.61	41.89
	<i>Leodamas tribulosus</i>	1.57	0.81	6.49	48.37
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	4.95	5.18	6.43	54.81
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.2	1.00	5.45	60.26
	<i>Syllis prolixa</i>	1.36	1.18	5.33	65.58
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.81	0.55	4.36	69.94
	<i>Corbula patagonica</i>	0.00	0.77	3.95	73.89
	<i>Syllis sp.</i>	1.09	1.24	3.87	77.76
	<i>Boccardia sp. 1 (claparedei)</i>	0.46	0.00	2.57	80.33
	<i>Halosydnella australis</i>	0.00	0.5	2.51	82.84
	<i>Balanus glandula</i>	0.28	0.24	2.47	85.32
	<i>Monocorophium insidiosum</i>	0.00	0.43	2.41	87.72
<i>Alitta succinea</i>	0.44	0.00	2.41	90.13	

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Playita, Luna Roja Disimilitud media: 49.48	<i>Mytilus edulis</i>	4.84	2.31	10.98	10.98
	<i>Tanais dulonguii</i>	2.34	1.52	8.18	19.16
	<i>Boccardia sp. 1 (claparedei)</i>	1.93	0.00	7.77	26.92
	<i>Siphonaria lessoni</i>	2.87	1.65	7.67	34.59
	<i>Boccardia proboscidea</i>	2.47	0.55	7.55	42.14
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	4.02	5.18	5.26	47.4
	<i>Clunio brasiliensis</i>	3.3	2.48	5.18	52.59
	<i>Syllis prolixa</i>	0.56	1.18	4.25	56.84
	Larvas de <i>Boccardia sp.</i>	1.04	0.00	4.05	60.89
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.2	1.00	3.91	64.8
	<i>Monocorophium insidiosum</i>	0.64	0.43	3.36	68.16
	<i>Alitta succinea</i>	0.76	0.00	3.03	71.18
	<i>Syllis sp.</i>	0.96	1.24	2.95	74.13
<i>Corbula patagonica</i>	0.00	0.77	2.87	77.00	

<i>Leodamas tribulosus</i>	0.4	0.81	2.84	79.84
<i>Hyale grandicornis</i>	0.28	0.55	2.4	82.24
<i>Balanus glandula</i>	0.42	0.24	2.38	84.62
<i>Idotea baltica</i>	0.48	0.00	1.86	86.49
<i>Halosydnella australis</i>	0.00	0.5	1.83	88.31
<i>Nereididae</i>	0.44	0.00	1.78	90.1

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Quequén, Emisario	<i>Boccardia proboscidea</i>	7.31	2.13	18.47	18.47
Disimilitud media: 70.37	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	1.41	4.22	10.4	28.87
	<i>Tanais dulonguii</i>	2.43	0.00	8.92	37.79
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.00	2.54	8.76	46.56
	<i>Siphonaria lessoni</i>	0.00	1.91	6.66	53.22
	<i>Syllis proluxa</i>	0.00	1.81	6.22	59.44
	<i>Syllis sp.</i>	0.00	1.74	5.98	65.42
	<i>Nematoda</i>	1.59	1.47	5.84	71.26
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.00	1.51	5.2	76.46
	<i>Alitta succinea</i>	1.21	1.47	4.5	80.96
	<i>Clunio brasiliensis</i>	1.09	0.48	4.02	84.98
	<i>Platynereis sp.</i>	0.00	1.14	3.91	88.88
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.00	0.72	2.46	91.35

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Costa Bonita, Emisario	<i>Boccardia proboscidea</i>	0.68	2.13	9.52	9.52
Disimilitud media: 54.48	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.44	2.54	9.12	18.65
	<i>Clunio brasiliensis</i>	2.14	0.48	7.91	26.56
	<i>Hyale grandicornis</i>	2.03	0.72	6.28	32.84
	<i>Siphonaria lessoni</i>	3.03	1.91	6.26	39.1
	<i>Tanais dulonguii</i>	1.46	0.00	6.2	45.3
	<i>Syllis sp.</i>	0.33	1.74	6.17	51.47
	<i>Syllis proluxa</i>	0.52	1.81	6.13	57.6
	<i>Nematoda</i>	0.33	1.47	5.66	63.27
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	5.04	4.22	5.09	68.35
	<i>Platynereis sp.</i>	0.00	1.14	4.48	72.83
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.77	1.51	4.36	77.19
	<i>Mytilus edulis</i>	0.99	0.43	4.34	81.53
	<i>Balanus glandula</i>	0.99	0.00	4.22	85.75
	<i>Alitta succinea</i>	0.92	1.47	4.02	89.77
	<i>Rhynchospio glutaea</i>	0.00	0.68	2.7	92.47

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Las Brusquitas, Emisario	<i>Mytilus edulis</i>	3.99	0.43	15.76	15.76
Disimilitud media: 49.94	<i>Clunio brasiliensis</i>	2.59	0.48	9.6	25.35
	<i>Boccardia proboscidea</i>	1.85	2.13	8.52	33.87
	<i>Leodamas tribulosus</i>	1.57	2.54	7.09	40.96
	<i>Nematoda</i>	0.00	1.47	6.74	47.7
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.2	1.51	5.77	53.47
	<i>Alitta succinea</i>	0.44	1.47	5.48	58.96
	<i>Siphonaria lessoni</i>	2.46	1.91	5.24	64.2
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	4.95	4.22	4.98	69.18
	<i>Syllis sp.</i>	1.09	1.74	4.78	73.96
	<i>Syllis proluxa</i>	1.36	1.81	4.71	78.67
	<i>Platynereis sp.</i>	0.2	1.14	4.56	83.23
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.81	0.72	4.04	87.27
	<i>Rhynchospio glutaea</i>	0.00	0.68	2.81	90.08

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Playita, Emisario Disimilitud media: 62.00	<i>Mytilus edulis</i>	4.84	0.43	13.88	13.88
	<i>Clunio brasiliensis</i>	3.3	0.48	8.94	22.82
	<i>Tanais dulonguii</i>	2.34	0.00	7.25	30.07
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.4	2.54	6.88	36.95
	<i>Boccardia proboscidea</i>	2.47	2.13	6.17	43.12
	<i>Boccardia</i> sp. 1 (<i>claparedei</i>)	1.93	0.00	6.01	49.13
	<i>Siphonaria lessoni</i>	2.87	1.91	5.27	54.4
	Nematoda	0.00	1.47	4.76	59.16
	<i>Syllis prolixa</i>	0.56	1.81	4.5	63.66
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.2	1.51	4.14	67.8
	<i>Syllis</i> spp.	0.96	1.74	3.61	71.42
	<i>Platynereis</i> sp.	0.00	1.14	3.34	74.76
	<i>Alitta succinea</i>	0.76	1.47	3.26	78.02
	Larvas de <i>Boccardia</i> sp.	1.04	0.00	3.14	81.16
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	4.02	4.22	2.85	84.01
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.28	0.72	2.39	86.4
	<i>Monocorophium insidiosum</i>	0.64	0.00	2.07	88.47
<i>Rhynchospio glutaea</i>	0.00	0.68	2.01	90.48	

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Luna Roja, Emisario Disimilitud media: 57.47	<i>Boccardia proboscidea</i>	0.55	2.13	8.94	8.94
	<i>Clunio brasiliensis</i>	2.48	0.48	8.14	17.09
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.81	2.54	7.98	25.06
	<i>Mytilus edulis</i>	2.31	0.43	7.82	32.89
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	5.18	4.22	6.13	39.02
	<i>Alitta succinea</i>	0.00	1.47	6.06	45.08
	<i>Siphonaria lessoni</i>	1.65	1.91	6.04	51.12
	Nematoda	0.2	1.47	5.68	56.79
	<i>Tanais dulonguii</i>	1.52	0.00	5.16	61.96
	<i>Syllis prolixa</i>	1.18	1.81	5.1	67.06
	<i>Lineus bonaerensis</i>	1.00	1.51	4.48	71.54
	<i>Platynereis</i> sp.	0.2	1.14	4.11	75.65
	<i>Syllis</i> sp.	1.24	1.74	4.09	79.73
	<i>Rhynchospio glutaea</i>	0.52	0.68	3.37	83.11
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.55	0.72	3.21	86.32
	<i>Corbula patagonica</i>	0.77	0.00	2.78	89.1
	<i>Halosydnella australis</i>	0.5	0.24	2.00	91.1

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Quequén, Sta. Clara Disimilitud media: 87.88	<i>Boccardia proboscidea</i>	7.31	0.00	24.59	24.59
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	1.41	5.13	12.51	37.1
	<i>Siphonaria lessoni</i>	0.00	3.16	10.72	47.81
	<i>Tanais dulonguii</i>	2.43	0.00	7.88	55.69
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.00	1.9	6.28	61.97
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.00	1.75	5.73	67.7
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.00	1.76	5.62	73.31
	<i>Syllis</i> sp.	0.00	1.72	5.52	78.84
	Nematoda	1.59	0.86	5.07	83.91
	<i>Alitta succinea</i>	1.21	0.00	4.09	88.01
	<i>Syllis prolixa</i>	0.00	1.12	3.67	91.68

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Costa Bonita, Sta. Clara Disimilitud media: 41.49	<i>Clunio brasiliensis</i>	2.14	0.5	10.2	10.2
	<i>Syllis</i> sp.	0.33	1.72	9.04	19.24
	<i>Tanais dulonguii</i>	1.46	0.00	8.89	28.12
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.44	1.76	8.82	36.95
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.77	1.9	6.7	43.65

<i>Syllis prolixa</i>	0.52	1.12	6.66	50.3
<i>Balanus glandula</i>	0.99	0.00	6.05	56.36
<i>Mytilus edulis</i>	0.99	0.00	6.03	62.39
<i>Alitta succinea</i>	0.92	0.00	5.55	67.94
<i>Siphonaria lessoni</i>	3.03	3.16	5.3	73.24
<i>Nematoda</i>	0.33	0.86	5.05	78.29
<i>Boccardia proboscidea</i>	0.68	0.00	4.04	82.33
<i>Hyale grandicornis</i>	2.03	1.75	3.57	85.9
<i>Sphaeroma serratum</i>	0.47	0.26	3.35	89.24
<i>Brachidontes rodriguezii</i>	5.04	5.13	2.88	92.13

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Las Brusquitas, Sta. Clara	<i>Mytilus edulis</i>	3.99	0.00	20.76	20.76
Disimilitud media: 45.92	<i>Clunio brasiliensis</i>	2.59	0.5	11.06	31.82
	<i>Boccardia proboscidea</i>	1.85	0.00	9.7	41.52
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.2	1.9	8.8	50.32
	<i>Syllis</i> sp.	1.09	1.72	5.54	55.85
	<i>Siphonaria lessoni</i>	2.46	3.16	5.39	61.25
	<i>Syllis prolixa</i>	1.36	1.12	5.31	66.56
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.81	1.75	5.22	71.78
	<i>Leodamas tribulosus</i>	1.57	1.76	5.04	76.82
	<i>Nematoda</i>	0.00	0.86	4.74	81.56
	<i>Tanais dulonguii</i>	0.53	0.00	2.8	84.35
	<i>Boccardia</i> sp. 1 (<i>claparedei</i>)	0.46	0.00	2.37	86.72
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	4.95	5.13	2.31	89.03
	<i>Alitta succinea</i>	0.44	0.00	2.22	91.25

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Playita, Sta. Clara	<i>Mytilus edulis</i>	4.84	0.00	16.08	16.08
Disimilitud media: 63.06	<i>Clunio brasiliensis</i>	3.3	0.5	9.42	25.51
	<i>Boccardia proboscidea</i>	2.47	0.00	8.23	33.74
	<i>Tanais dulonguii</i>	2.34	0.00	7.68	41.41
	<i>Boccardia</i> sp. 1 (<i>claparedei</i>)	1.93	0.00	6.37	47.78
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.2	1.9	5.63	53.41
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.4	1.76	4.95	58.36
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.28	1.75	4.86	63.22
	<i>Siphonaria lessoni</i>	2.87	3.16	4.39	67.61
	<i>Syllis</i> sp.	0.96	1.72	3.78	71.39
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	4.02	5.13	3.62	75.02
	<i>Syllis prolixa</i>	0.56	1.12	3.57	78.59
	Larvas de <i>Boccardia</i> sp.	1.04	0.00	3.32	81.91
	<i>Nematoda</i>	0.00	0.86	3.00	84.9
	<i>Alitta succinea</i>	0.76	0.00	2.48	87.39
	<i>Monocorophium insidiosum</i>	0.64	0.00	2.2	89.59
	<i>Idotea baltica</i>	0.48	0.26	1.82	91.41

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Luna Roja, Sta. Clara	<i>Mytilus edulis</i>	2.31	0.00	10.33	10.33
Disimilitud media: 50.57	<i>Clunio brasiliensis</i>	2.48	0.5	10.02	20.35
	<i>Siphonaria lessoni</i>	1.65	3.16	9.57	29.92
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.55	1.75	6.48	36.4
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.81	1.76	6.44	42.84
	<i>Tanais dulonguii</i>	1.52	0.00	6.34	49.18
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	5.18	5.13	6.04	55.22
	<i>Syllis prolixa</i>	1.18	1.12	5.72	60.94
	<i>Lineus bonaerensis</i>	1.00	1.9	5.71	66.65
	<i>Syllis</i> sp.	1.24	1.72	4.88	71.53
	<i>Nematoda</i>	0.2	0.86	4.3	75.84

<i>Corbula patagonica</i>	0.77	0.00	3.43	79.27
<i>Boccardia proboscidea</i>	0.55	0.00	3.34	82.61
<i>Halosydnella australis</i>	0.5	0.24	2.54	85.15
<i>Monocorophium insidiosum</i>	0.43	0.00	2.11	87.26
<i>Rhynchospio glutaea</i>	0.52	0.00	2.03	89.29
<i>Exogonine</i> sp.	0.42	0.00	1.64	90.93

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Emisario, Sta. Clara	<i>Boccardia proboscidea</i>	2.13	0.00	13.06	13.06
Disimilitud media: 44.92	<i>Siphonaria lessoni</i>	1.91	3.16	9.15	22.22
	<i>Leodamas tribulosus</i>	2.54	1.76	8.23	30.44
	<i>Alitta succinea</i>	1.47	0.00	8.12	38.56
	<i>Hyle grandicornis</i>	0.72	1.75	7.15	45.71
	<i>Syllis proluxa</i>	1.81	1.12	6.98	52.69
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	4.22	5.13	6.86	59.55
	<i>Platynereis</i> sp.	1.14	0.00	5.62	65.17
	Nematoda	1.47	0.86	5.41	70.58
	<i>Syllis</i> spp.	1.74	1.72	5.1	75.68
	<i>Lineus bonaerensis</i>	1.51	1.9	4.32	80.01
	<i>Clunio brasiliensis</i>	0.48	0.5	3.96	83.97
	<i>Rhynchospio glutaea</i>	0.68	0.00	3.38	87.35
	<i>Mytilus edulis</i>	0.43	0.00	2.16	89.52
	<i>Idotea baltica</i>	0.24	0.26	2.09	91.61

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Quequén, Mar de Cobo	<i>Boccardia proboscidea</i>	7.31	0.99	27.11	27.11
Disimilitud media: 80.06	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	1.41	4.74	14.94	42.05
	<i>Tanais dulonguii</i>	2.43	0.00	10.18	52.23
	Nematoda	1.59	0.5	6.51	58.73
	<i>Alitta succinea</i>	1.21	0.00	5.33	64.06
	<i>Siphonaria lessoni</i>	0.00	1.23	5.15	69.21
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.00	1.11	4.62	73.83
	<i>Balanus glandula</i>	0.00	1.2	4.62	78.46
	<i>Clunio brasiliensis</i>	1.09	0.36	4.32	82.78
	<i>Hyle grandicornis</i>	0.00	1.07	4.07	86.85
	<i>Idotea baltica</i>	0.5	0.4	2.63	89.48
	<i>Syllis</i> sp.	0.00	0.59	2.51	91.99

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Costa Bonita, Mar de Cobo	<i>Siphonaria lessoni</i>	3.03	1.23	11.1	11.1
Disimilitud media: 48.87	<i>Clunio brasiliensis</i>	2.14	0.36	11.07	22.17
	<i>Balanus glandula</i>	0.99	1.2	8.75	30.92
	<i>Tanais dulonguii</i>	1.46	0.00	8.69	39.61
	<i>Hyle grandicornis</i>	2.03	1.07	7.2	46.81
	<i>Boccardia proboscidea</i>	0.68	0.99	7.1	53.91
	<i>Mytilus edulis</i>	0.99	0.00	5.89	59.8
	<i>Alitta succinea</i>	0.92	0.00	5.41	65.21
	<i>Syllis</i> sp.	0.33	0.59	3.88	69.09
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.77	1.11	3.86	72.95
	Nematoda	0.33	0.5	3.82	76.77
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.44	0.55	3.8	80.56
	<i>Syllis proluxa</i>	0.52	0.33	3.76	84.32
	<i>Sphaeroma serratum</i>	0.47	0.00	2.83	87.15
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	5.04	4.74	2.57	89.72
	<i>Idotea baltica</i>	0.00	0.4	2.08	91.8

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Las Brusquitas, Mar de Cobo	<i>Mytilus edulis</i>	3.99	0.00	21.14	21.14
Disimilitud media: 51.48	<i>Clunio brasiliensis</i>	2.59	0.36	12.09	33.23
	<i>Siphonaria lessoni</i>	2.46	1.23	7.12	40.35
	<i>Boccardia proboscidea</i>	1.85	0.99	6.73	47.08
	<i>Leodamas tribulosus</i>	1.57	0.55	6.58	53.66
	<i>Syllis prolixa</i>	1.36	0.33	6.27	59.92
	<i>Balanus glandula</i>	0.28	1.2	6.23	66.15
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.2	1.11	5.15	71.3
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.81	1.07	5.13	76.42
	<i>Syllis</i> sp.	1.09	0.59	4.67	81.1
	<i>Boccardia</i> sp. 1 (<i>claparedei</i>)	0.46	0.39	3.34	84.43
	<i>Tanais dulonguii</i>	0.53	0.00	2.86	87.29
	<i>Platynereis</i> sp.	0.2	0.3	2.38	89.67
	<i>Nematoda</i>	0.00	0.5	2.28	91.95

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Playita, Mar de Cobo	<i>Mytilus edulis</i>	4.84	0.00	18.04	18.04
Disimilitud media: 63.05	<i>Clunio brasiliensis</i>	3.3	0.36	11.15	29.18
	<i>Tanais dulonguii</i>	2.34	0.00	8.6	37.78
	<i>Siphonaria lessoni</i>	2.87	1.23	6.98	44.76
	<i>Boccardia proboscidea</i>	2.47	0.99	6.25	51.01
	<i>Boccardia</i> sp. 1 (<i>claparedei</i>)	1.93	0.39	6.14	57.14
	<i>Balanus glandula</i>	0.42	1.2	4.57	61.72
	Larvas de <i>Boccardia</i> sp.	1.04	0.00	3.71	65.42
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.28	1.07	3.65	69.07
	<i>Lineus bonaerensis</i>	0.2	1.11	3.63	72.71
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	4.02	4.74	3.16	75.87
	<i>Syllis</i> sp.	0.96	0.59	3.03	78.9
	<i>Alitta succinea</i>	0.76	0.00	2.78	81.68
	<i>Monocorophium insidiosum</i>	0.64	0.00	2.48	84.16
	<i>Syllis prolixa</i>	0.56	0.33	2.4	86.55
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.4	0.55	2.31	88.87
	<i>Idotea baltica</i>	0.48	0.4	2.02	90.89

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Luna Roja, Mar de Cobo	<i>Clunio brasiliensis</i>	2.48	0.36	10.45	10.45
Disimilitud media: 56.85	<i>Mytilus edulis</i>	2.31	0.00	10.41	20.86
	<i>Siphonaria lessoni</i>	1.65	1.23	7.26	28.12
	<i>Tanais dulonguii</i>	1.52	0.00	6.33	34.45
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	5.18	4.74	6.17	40.63
	<i>Balanus glandula</i>	0.24	1.2	5.85	46.48
	<i>Syllis prolixa</i>	1.18	0.33	5.6	52.08
	<i>Boccardia proboscidea</i>	0.55	0.99	5.49	57.57
	<i>Syllis</i> sp.	1.24	0.59	5.09	62.66
	<i>Hyale grandicornis</i>	0.55	1.07	4.87	67.53
	<i>Lineus bonaerensis</i>	1.00	1.11	4.49	72.02
	<i>Leodamas tribulosus</i>	0.81	0.55	3.8	75.82
	<i>Corbula patagonica</i>	0.77	0.00	3.45	79.27
	<i>Nematoda</i>	0.2	0.5	2.79	82.06
	<i>Platynereis</i> sp.	0.2	0.3	2.27	84.33
	<i>Halosydnella australis</i>	0.5	0.00	2.19	86.52
	<i>Monocorophium insidiosum</i>	0.43	0.00	2.15	88.67
	<i>Rhynchospio glutaea</i>	0.52	0.00	2.01	90.68

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Emisario, Mar de Cobo	<i>Boccardia proboscidea</i>	2.13	0.99	11.09	11.09
Disimilitud media: 55.49	<i>Leodamas tribulosus</i>	2.54	0.55	10.3	21.39

<i>Alitta succinea</i>	1.47	0.00	7.58	28.97
<i>Syllis prolixa</i>	1.81	0.33	7.56	36.53
<i>Nematoda</i>	1.47	0.5	7.26	43.79
<i>Siphonaria lessoni</i>	1.91	1.23	6.59	50.38
<i>Syllis sp.</i>	1.74	0.59	6.54	56.92
<i>Brachidontes rodriguezii</i>	4.22	4.74	5.65	62.57
<i>Balanus glandula</i>	0.00	1.2	5.43	68.01
<i>Hyale grandicornis</i>	0.72	1.07	5.13	73.14
<i>Platynereis sp.</i>	1.14	0.3	5.03	78.17
<i>Lineus bonaerensis</i>	1.51	1.11	4.41	82.58
<i>Clunio brasiliensis</i>	0.48	0.36	3.16	85.74
<i>Rhynchospio glutaea</i>	0.68	0.00	3.1	88.84
<i>Idotea baltica</i>	0.24	0.4	2.14	90.98

Sitios	Especies	Prom. Abun.	Prom. Abun.	Contribución (%)	Acum. (%)
Sta. Clara, Mar de Cobo	<i>Siphonaria lessoni</i>	3.16	1.23	14.2	14.2
Disimilitud media: 44.85	<i>Leodamas tribulosus</i>	1.76	0.55	9.47	23.67
	<i>Syllis sp.</i>	1.72	0.59	9.14	32.81
	<i>Hyale grandicornis</i>	1.75	1.07	7.84	40.65
	<i>Boccardia proboscidea</i>	0.00	0.99	7.6	48.25
	<i>Syllis prolixa</i>	1.12	0.33	7.49	55.74
	<i>Balanus glandula</i>	0.00	1.2	7.39	63.13
	<i>Nematoda</i>	0.86	0.5	7.1	70.23
	<i>Lineus bonaerensis</i>	1.9	1.11	5.57	75.8
	<i>Clunio brasiliensis</i>	0.5	0.36	4.15	79.95
	<i>Brachidontes rodriguezii</i>	5.13	4.74	3.77	83.72
	<i>Idotea baltica</i>	0.26	0.4	3.25	86.97
	<i>Platynereis sp.</i>	0.00	0.3	2.36	89.33
	<i>Boccardia sp. 1 (claparedei)</i>	0.00	0.39	2.21	91.53