

MATERIAL SUPLEMENTARIO D

Abundancia de tipos funcionales de herbáceas (kg MS/ha), según nivel de lignificación.
 x = promedio, D.E. = desviación estándar.

Abundance of herbaceous plant functional types (kg DM/ha), according to woody encroachment level.
 x̄ = average, D.E. = standard deviation.

Tipos funcionales	Lig. Muy baja		Lig. Baja		Lig. Moderada		Lig. Alta	
	x̄	D.E.	x̄	D.E.	x̄	D.E.	x̄	D.E.
Gramíneas	4195.6	726.3	3541.4	1781.5	2663.6	1917.9	1510.8	1567.0
Hierbas (hoja ancha)	478.5	701.1	464.2	462.8	572.2	325.2	452.4	400.9
Gramíneas anuales	0.0	0.0	31.0	80.4	6.2	12.2	0.0	0.0
Gramíneas perennes	4195.6	726.3	3510.3	1811.5	2657.4	1919.0	1510.8	1567.0
Gramíneas palatables	2454.3	2035.1	3272.5	1876.5	2463.3	1918.9	1504.0	1566.2
Gramíneas poco palatables	1741.3	1453.9	268.9	762.3	200.3	703.5	6.8	15.1
Gramíneas tolerantes a la sombra	1243.2	1518.9	1587.4	919.1	1479.6	1354.1	879.4	1090.6
Gramíneas intolerantes a la sombra	2952.4	972.8	1954.0	1653.5	1183.9	1250.5	631.4	745.4
Gramíneas con tolerancia alta al fuego	523.9	143.5	353.4	281.4	155.5	203.4	29.0	34.9
Gramíneas con tolerancia media a baja al fuego	98.1	120.1	80.8	127.7	42.2	82.8	85.5	142.5