

## Supplementary Material

### General aspects of the three studied coot species

White-winged coot (*Fulica leucoptera*) is the smallest (body size ~30 cm) of overall studied coots and is distinguished from its congeners by yellow to greenish yellow bill, and small pale yellow to orange yellow shield, rounded at top giving round-headed appearance. The species shows white undertail-coverts very conspicuous as bird swims away with raised tail; with line formed by broad white tips to secondaries conspicuous in flight. Red-fronted coot (*F. rufifrons*) (body size ~32 cm) is overall dark slate grey, blacker on head and neck; prominent white undertail-coverts from inverted heart shape; characteristic profile with almost straight line from bill tip to knob-like top of elongated frontal shield, bill yellow, ridge and frontal shield dark chestnut-red. Red-gartered coot (*F. armillata*) is the largest of all studied coots (body size ~35 cm) with white undertail-coverts and no white on secondaries; pointed frontal shield, giving somewhat angular profile, and distinct red mark along base of culmen, separating yellow of bill and shield. Legs and feet orange-yellow to yellow, with pale red 'garter' above ankle joint (del Hoyo et al. 1992).

### Aspectos generales de las tres especies de gallaretas estudiadas

La gallareta chica (*Fulica leucoptera*) es la más pequeña (tamaño corporal ~30 cm) de las gallaretas estudiadas. Se distingue de sus congéneres por su pico de color amarillo a amarillo verdoso, y un pequeño escudo, de color amarillo pálido a amarillo anaranjado, redondeado en la parte superior, lo que le da la apariencia de una cabeza redondeada. La especie muestra coberturas infracaudales blancas muy visibles cuando el ave nada con la cola levantada; la línea formada por las puntas anchas y blancas de las secundarias es visible en vuelo. La gallareta escudete rojo (*F. rufifrons*) (tamaño corporal ~32 cm) es en general de coloración gris pizarra oscuro, más negra en la cabeza y el cuello; coberturas infracaudales blancas prominentes debido a su forma de corazón invertido; perfil característico con una línea casi recta desde la punta del pico hasta la parte superior en forma de protuberancia del escudo frontal alargado; pico amarillo, cresta y escudo frontal de color rojo castaño oscuro. La gallareta ligas rojas (*F. armillata*) es la gallareta más grande de todas las estudiadas (tamaño corporal ~35 cm), con coberturas infracaudales blancas y secundarias sin blanco; escudo frontal puntiagudo, que le da un perfil algo angular, y una marca roja distintiva a lo largo de la base del culmen, que separa el amarillo del pico del escudo. Patas y pies de color amarillo anaranjado a amarillo, con una 'liga' roja pálida sobre la articulación del tobillo (del Hoyo et al. 1992).