

Actividad forrajera de *Acromyrmex lobicornis* Emery (Hymenoptera: Formicidae) en un pastizal natural semiárido de la provincia de La Pampa (Argentina)

Pilati, A. , E. M. Quirán & H. D. Esterlich

[\[Descargar el artículo\]](#) (262 KB)

Microhábitat preferido de *Peromyscus maniculatus* (Rodentia, Cricetidae) en plantaciones jóvenes de pino en el bosque boreal Canadiense [En inglés]

M. Isabel Bellocq & Sandy M. Smith

[\[Descargar el artículo\]](#) (198 KB)

Composición de las comunidades arbóreas de la Isla Martín García en relación a un gradiente ambiental

Arturi, M. F. & M. C. Juarez

[\[Descargar el artículo\]](#) (202 KB)

Banco de semillas en distintas posiciones topográficas en un sector agrícola del centro de la Provincia de Buenos Aires

Requesens, E. , R. Scaramuzzino, E. Orfila, R. Mendez Escobar & M. Gandini

[\[Descargar el artículo\]](#) (131 KB)

La sensibilidad de la prueba de la recorrida común para evaluar la disposición espacial de una planta infectada [En inglés]

E. V. Trumper & D. E. Gorla

[\[Descargar el artículo\]](#) (187 KB)

Comparación experimental de la tasa de descomposición foliar de especies vegetales del centro-oeste de Argentina

Perez Harguindeguy, N. , S. Díaz, J. H. C. (Hans) Cornelissen & M. Cabido

[\[Descargar el artículo\]](#) (299 KB)

Comunidad de hormigas de los tocones de árboles muertos en tres reservas del bosque atlántico brasilero (Hymenoptera, Formicidae) [En francés]

J.H.C. Delabie, S. Lacau, I.C. do Nascimento, A.B. Casimiro & I.M. Cazorla

[\[Descargar el artículo\]](#) (310 KB)