

Distribución de los huevos de *Epinotia aporema* (Lepidoptera, Tortricidae) en la planta de de soja

Pereyra, P. C., N. E. Sánchez & M. V. Gentile

[\[Descargar el artículo\]](#) (614 KB)

Relación entre las preferencias de oviposición de las hembras y los sitios de alimentación de las larvas del barrenador del brote de la soja, *Epinotia aporema* (Lepidoptera, Tortricidae)

Sánchez, N. E., P. C. Pereyra & M. V. Gentile

[\[Descargar el artículo\]](#) (314 KB)

Desempeño fisiológico y crecimiento bajo tratamientos de baja y alta intensidad lumínica en tres especies neotropicales de *Cecropia* [En inglés]

Folgarait, P. J.

[\[Descargar el artículo\]](#) (452 KB)

Predación de semillas de *Acacia aroma* por el brúchido *Pseudopachymerina grata* en función de la posición de las semillas y el número de semillas por vaina

Aizen, M. A.

[\[Descargar el artículo\]](#) (272 KB)

Estimación de la productividad primaria neta de ecosistemas terrestres del mundo en relación a factores ambientales

Gómez, I. A. & G. C. Gallopín

[\[Descargar el artículo\]](#) (1568 KB)

Selectividad del parasitoide *Trichopoda giacomellii* (Blanchard) (Diptera: Tachinidae) hacia individuos de *Nezara viridula* (L) (Hemiptera: Pentatomidae) que difieren en el estado de desarrollo, sexo, edad y patrones de coloración

Liljesthröm, G.

[\[Descargar el artículo\]](#) (564 KB)

Consumo y eficiencia digestiva del Mara, *Dolichotis patagonum* (Rodentia: Caviidae)

Kufner, M. B. & G. Durañona

[\[Descargar el artículo\]](#) (262 KB)

El análisis de componentes principales de tablas de florísticas de presencia-ausencia como herramienta para análisis de gradientes ambientales. Un estudio de caso en la Quebrada de Vaquerías (Valle Hermoso, Córdoba)

Montaña, C. & E. Ezcurra

[\[Descargar el artículo\]](#) (1131 KB)